Ohta's Isan

太田胃散

芳香性健胃消化薬
自然(生薬)の良さを生かした胃腸薬

衛署藥輸字第 019627 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

【有效成分及含量】

成　　分		(1.3g)中
健　胃　劑	Cinnamon Bark	92 mg
	Fennel	24 mg
	Nutmeg	20 mg
	Clove	12 mg
	Citrus Unshiu Peel	22 mg
	Gentian	15 mg
	Powdered Picrasma Wood	15 mg
制　酸　劑	Sodium Bicarbonate	625 mg
	Precipitated Calcium Carbonate	133 mg
	Magnesium Carbonate	26 mg
	Synthetic Aluminum Silicate	273.4 mg
消 化 酵 素	Biodiastase	40 mg
其 他 成 分	(賦形劑)/ - Menthol	

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷爲胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多、食慾不振、胃腹部膨脹感、消化不良，幫助消化。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一)3歲以下。
(二)消化道潰瘍的人。
(三)有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
(四)有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感的人。
(五)有腎臟疾病的人。
(六)須限鹽飲食的人。
(七)腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)與其他藥品並用時。
(三)對於牛奶或乳製品耐受度低的人。

四、其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量。
(四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
(五)如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
(六)腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒；會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
(七)可能引起腹脹、打嗝。
(八)含鋁制酸成分可能會引起便秘或腹瀉，偶有噁心、嘔吐。

【用法用量】

餐後或兩餐之間服用。

年　齡	1次量	服用次數
成人(15歲以上)	1匙(1.3g)	1日3次
8～14歲	半匙(0.65g)	
未滿8歲	不宜服用	

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉
其他	偶有過敏

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治。
(一)若有任何不適情況產生。
(二)連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包 裝】盒裝：每包1.3公克鋁箔、100包以下。
罐裝：1000公克以下。【儲 存】25°C以下。

製造廠：株式会社 太田胃散
OHTA'S ISAN Co., Ltd.

藥商：幼祥實業股份有限公司
台北市新東街15巷13號

【公司地址】3-2, Sengoku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
【廠　址】957 Shishiko-cho, Ushiku-shi, Ibaraki-ken, Japan
【包裝廠】台灣陽生製藥工業股份有限公司
【地　址】屏東縣屏東市龍華路381號